

Título del estudio : Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en los distritos Ilo y Pacocha, provincia Ilo, departamento Moquegua, en enero de 2023.

Fecha de ejecución : Del 1 al 31 de enero de 2023

Expediente : 2020-02-0015 Código de acción : No aplica

Tipo de evaluación : Programada

Fecha de aprobación : 17 de marzo de 2023 Reporte N° : REAS-030-2023-STECS

1 INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1.1. Información general respecto de la actividad realizada

a.	Zona evaluada	Distritos Ilo y Pacocha, provincia Ilo, departamento Moquegua
b.	Unidades fiscalizables en la zona de estudio o actividades económicas	(1)Fundición y refinería de cobre Ilo-SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ. (2)Central Termoeléctrica Ilo1- ENGIE Energía Perú S.A. (3)Central Termoeléctrica Ilo21- ENGIE Energía Perú S.A. (4)Central Termoeléctrica Nodo energético Del Sur – Planta Ilo- ENGIE Energía Perú S.A. (5)Central Termoeléctrica Reserva Fría de Generación – Planta Ilo- ENGIE Energía Perú S.A.
c.	Problemática identificada	Presunta afectación de la calidad del aire debido a las actividades económicas, de la provincia Ilo.
d.	Periodo de ejecución	Del 1 al 31 de enero de 2023

Tabla 1.2. Listado de profesionales

N.°	Nombres y Apellidos	Profesión	Actividad desarrollada
1	Julio Andrés Gonzales Rossel	Ingeniero ambiental	Gabinete
2	Andrés Daniel Brios Abanto	Ingeniero ambiental y de recursos naturales	Gabinete
3	Mariella Rossana Atala Alvarez	Ingeniera ambiental	Gabinete
4	Jorge Luis Hualpa Amable	Ingeniero químico	Gabinete y campo

2 METODOLOGÍA

2.1 Protocolo de monitoreo

Tabla 2.1. Protocolo de monitoreo

Matriz	Protocolo	Sección	País	Institución	Dispositivo legal	Año
Aire	Protocolo nacional de monitoreo de la calidad ambiental del aire	Todo el documento	Perú	Minam	Decreto Supremo N.° 010-2019-MINAM	2019

2.2 Ubicación de estaciones de monitoreo

Tabla 2.2. Estaciones de monitoreo

N.º	Código	Coordenadas UTM WGS-84			Altitud m s. n. m.	Descripción
		Este (m)	Norte (m)	Zona		
1	CA-ILO-01	252226	8048774	19K	40	Ubicada en la Av. Pacifico, Mz. L, lote 1, UPIS Miramar, distrito de Ilo.
2	CA-ILO-02	251618	8051342	19K	30	Ubicado en la Av. Ingeniera, Mz. C, lote SC2, Agrupación Familiar Pueblo Nuevo (Plaza El Minero), distrito de Pacocha.
3	CA-ILO-03	253350	8047344	19K	174	Ubicado en Av. Mirador Boca de Sapo, Mz. 50, lote 9, Pampa Inalámbrica, distrito de Ilo.

2.3 Equipos y metodologías de análisis

Tabla 2.3. Equipos utilizados en las estaciones de monitoreo

Parámetro	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Certificado calibración
Estación de monitoreo CA-ILO-01					
Dióxido de azufre	Monitor automático de SO ₂	<i>Thermo Scientific</i>	43i	1200416204	LG-130-2022 LF-1542022
Dióxido de nitrógeno	Monitor automático de NO ₂	<i>Thermo Scientific</i>	42i	1192914962	LG-129-2022 LF-1532022
Sulfuro de hidrógeno	Monitor automático de H ₂ S	<i>Thermo Scientific</i>	450i	CM19490141	LG-128-2022 LF-1522022
Monóxido de carbono	Monitor automático de CO	<i>Thermo Scientific</i>	48i	1193085163	LG-127-2022 LF-1512022
- Velocidad de viento - Dirección de viento	Estación meteorológica	<i>Campbell Scientific</i>	CR310	WM174404	LM - 3612022
- Temperatura ambiente - Humedad relativa				1669292130	LM-3602022 LM-3592022
- Presión atmosférica				BPA11352	LM - 3622022
- Precipitación				TB00015748	LM - 3632022
- Radiación solar				193237	LM - 3642022
Estación de monitoreo CA-ILO-02					
Material particulado con diámetro menor a 10 micras (PM ₁₀)	Monitor automático de partículas	<i>GRIMM</i>	EDM 180	18A19091	LF-2932022
Material particulado con diámetro menor a 2,5 micras (PM _{2,5})					
Dióxido de azufre	Monitor automático de SO ₂	<i>Thermo Scientific</i>	43i	1192914947	LG-138-2022 LF-1622022
Dióxido de Nitrógeno	Monitor automático de NO ₂	<i>Thermo Scientific</i>	42i	1192914960	LG-048-2021 LG-0172021
Sulfuro de hidrógeno	Monitor automático de H ₂ S	<i>Thermo Scientific</i>	450i	CM19490139	LG-136-2022 LF-1602022
Monóxido de carbono	Monitor automático de CO	<i>Thermo Scientific</i>	48i	1193085161	LG-135-2022 LF-1592022
- Velocidad de viento - Dirección de viento	Estación meteorológica	<i>Campbell Scientific</i>	CR300	WM174402	LM - 3732022
- Temperatura ambiente - Humedad relativa				1663393889	LM - 3722022 LM - 3712022
- Presión atmosférica				BPA11350	LM - 3742022
- Precipitación				TB00015746	LM - 3752022
- Radiación solar				193287	LM - 3762022

Parámetro	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Certificado calibración
Estación de monitoreo CA-ILO-03					
Material particulado con diámetro menor a 10 micras (PM ₁₀)	Monitor automático de partículas	GRIMM	EDM 180	18A19093	LF-1692022
Material particulado con diámetro menor a 2,5 micras (PM _{2,5})					
Dióxido de azufre	Monitor automático de SO ₂	Thermo Scientific	43i	1192914948	LG-134-2022 LF-1582022
Dióxido de nitrógeno	Monitor automático de NO ₂	Thermo Scientific	42i	1192914961	LG-133-2022 LF-1572022
Sulfuro de hidrógeno	Monitor automático de H ₂ S	Thermo Scientific	450i	CM19490140	LG-132-2022 LF-1562022
Monóxido de carbono	Monitor automático de CO	Thermo Scientific	48i	1193085162	LG-131-2022 LF-1552022
- Velocidad de viento - Dirección de viento	Estación meteorológica	Campbell Scientific	CR300	WM174403	LM - 3672022
- Temperatura ambiente - Humedad relativa				1665884185	LM - 3662022 LM - 3652022
- Presión atmosférica				BPA11351	LM - 3682022
- Precipitación				TB00015747	LM - 3692022
- Radiación solar				193240	LM - 3702022

Tabla 2.4. Métodos de análisis de aire

Parámetro	Método	Técnica Empleada
Material particulado con diámetro menor a 2,5 micras (PM _{2,5})	Método automático	Dispersión de luz
Material particulado con diámetro menor a 10 micras (PM ₁₀)		
Dióxido de azufre (SO ₂)		Fluorescencia ultravioleta
Dióxido de nitrógeno (NO ₂)		Quimioluminiscencia
Sulfuro de hidrógeno (H ₂ S)		Fluorescencia ultravioleta
Monóxido de carbono (CO)		Infrarrojo no dispersivo
Material particulado con diámetro menor a 10 micras (PM ₁₀)	Método manual activo	Separación inercial/filtración (gravimetría)
Velocidad de viento	Método automático	-
Dirección de viento		
Temperatura ambiente		
Humedad relativa		
Precipitación		
Presión atmosférica		
Radiación solar		

Nota: las tres estaciones de monitoreo de la provincia de Ilo cuentan con las mismas técnicas de medición.

Fuente: Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire (Decreto Supremo N.° 010-2019-MINAM)

(-): no aplica

2.4 Criterios de evaluación

Tabla 2.5. Estándares de calidad ambiental (ECA) para aire

Parámetro	Periodo	Formato del estándar		Norma
		Valor ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Criterio de evaluación	
Material particulado con diámetro menor a 10 micras (PM_{10})	24 horas	100	No exceder más de 7 veces al año	D.S. N.º 003-2017-MINAM «Estándares de calidad ambiental (ECA) para aire y disposiciones complementarias»
Material particulado con diámetro menor a 2.5 micras ($\text{PM}_{2.5}$)	24 horas	50	No exceder más de 7 veces al año	
Sulfuro de hidrogeno (H_2S)	24 horas	150	Media aritmética	
Dióxido de azufre (SO_2)	24 horas	250	No exceder más de 7 veces al año	
Dióxido de nitrógeno (NO_2)	1 hora	200	No exceder más de 24 veces al año	
Monóxido de carbono (CO)	1 hora	30000	No exceder más de 1 vez al año	
	8 horas	10000	Media aritmética móvil	

Tabla 2.6. Niveles de estado de alerta nacionales para contaminantes de aire

Tipos de Alerta	Dióxido de Azufre (SO_2)	Norma
Cuidado	>500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ promedio móvil 3 horas	D. S. N.º 009-2003-SA «Reglamento de los niveles de estados de alerta nacionales para Contaminantes del aire»
Peligro	>1500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ promedio móvil 3 horas	
Emergencia	>2500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ promedio móvil 3 horas	

3 RESULTADOS

Las condiciones meteorológicas y los parámetros atmosféricos registrados en las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, en enero de 2023, son presentadas en el Anexo 3.

3.1 Parámetros meteorológicos

En la Tabla 3.1 se presentan los parámetros meteorológicos registrados en la estación de monitoreo CA-ILO-01, durante el mes de enero de 2023. Se observa que la presión atmosférica varió entre una mínima de 999,0 hPa y una máxima de 1009,8 hPa, no se registraron precipitaciones en el mes. La temperatura promedio fue 23,5 °C, alcanzando una mínima de 19,6 °C y una máxima de 28,4 °C, la humedad relativa varió entre 51,0 y 87,6 % y la velocidad del viento osciló entre 0,0 y 8,1 m/s. El parámetro de radiación solar reporta una irradiancia máxima de 1086,0 W/m^2 durante el mes de enero. Los valores se presentan en la Tabla 3.1, y el detalle del registro en el Anexo 3.

Tabla 3.1. Resultados de los parámetros meteorológicos registrados en la estación de monitoreo CA-ILO-01, enero de 2023.

Valores	Presión atmosférica (hPa)	Precipitación (mm)	Temperatura (°C)	Humedad relativa (%)	Velocidad del viento (m/s)	Radiación solar (W/m^2)
Mínimo	999,0	0,0	19,6	51,0	0,0	0,0
Máximo	1009,8	0,0	28,4	87,6	8,1	1086,0
Promedio	1004,5	0,0	23,5	67,9	3,4	--

En la Figura 3.1.1 se grafica la rosa de viento de la estación de monitoreo CA-ILO-01, correspondiente al mes enero de 2023. Se observa que la rosa de viento tuvo una

predominancia sursureste (SSE) y sur (S). Es preciso mencionar que, en la referida dirección se encuentran los almacenes de Ceticos Ilo (tomándose como referencia la ubicación de la estación de monitoreo CA-ILO-01).




Figura 3.1.1. Rosa de viento de la estación de monitoreo CA-ILO-01, enero de 2023

En la Figura 3.1.2 se grafica la rosa de viento de la estación de monitoreo CA-ILO-01, por días de la semana, correspondiente al mes enero de 2023. De la que se observa una predominancia sursureste (SSE) de lunes a viernes y una predominancia de vientos desde el sur (S) los sábados y domingos.




Figura 3.1.2. Rosa de viento por días de la semana de la estación de monitoreo CA-ILO-01, enero de 2023

En la Figura 3.1.3 se grafica la rosa de viento de la estación de monitoreo CA-ILO-01, por horas del día, correspondiente al mes enero de 2023. Donde se observa, un incremento en la presencia de vientos bastante marcada durante el día, desde las 9:00 hasta las 20:00 horas aproximadamente, sobre todo de los vientos que vienen del sur (S) y sursureste (SSE). Por el contrario, durante la noche se observa un estado de calma respecto a los vientos durante el día.




Figura 3.1.3. Rosa de viento horaria de la estación de monitoreo CA-ILO-01, enero de 2023

En la Tabla 3.2 se presentan los parámetros meteorológicos registrados en la estación de monitoreo CA-ILO-02, durante el mes de enero de 2023. Se observa que la presión atmosférica varió entre una mínima de 1001,5 hPa y una máxima de 1012,0 hPa, no se registraron precipitaciones en el mes. La temperatura promedio fue de 23,3 °C, alcanzando una mínima de 18,9°C y una máxima de 28,9 °C, la humedad relativa varió entre 52,7 y 86,7% y la velocidad del viento osciló entre 0,1 y 7,6 m/s. El parámetro de radiación solar reporta una irradiancia máxima de 1079,8 W/m² durante el mes de enero. Los valores se presentan en la Tabla 3.2, y el detalle del registro en el Anexo 3.

Tabla 3.2. Parámetros meteorológicos registrados en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023.

Valores	Presión atmosférica (hPa)	Precipitación (mm)	Temperatura (°C)	Humedad relativa (%)	Velocidad del viento (m/s)	Radiación solar (W/m ²)
Mínimo	1001,5	0,0	18,9	52,7	0,1	0,0
Máximo	1012,0	0,0	28,9	86,7	7,6	1079,8
Promedio	1006,5	0,0	23,3	68,9	2,7	--

En la Figura 3.1.4 se grafica la rosa de viento de la estación de monitoreo CA-ILO-02 correspondiente al mes de enero de 2023. Se observa que la rosa de viento tuvo una predominancia sur (S) y sursureste (SSE).




Figura 3.1.4. Rosa de viento de la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023

En la Figura 3.1.5 se grafica la rosa de viento de la estación de monitoreo CA-ILO-02, por días de la semana, correspondiente al mes enero de 2023. Donde se observa una predominancia sur (S) los días martes, miércoles, sábado y domingo. Y mayor presencia de vientos desde el sursureste (SSE) los días lunes, jueves y viernes.




Figura 3.1.5. Rosa de viento por días de la semana de la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023

En la Figura 3.1.6 se grafica la rosa de viento de la estación de monitoreo CA-ILO-02, por horas del día, correspondiente al mes enero de 2023. Donde se observa un incremento en la presencia de vientos bien marcada durante el día, iniciando el incremento desde las 10:00 hasta las 20:00 horas aproximadamente, con vientos provenientes desde el sur (S) y sursureste (SSE). Durante la noche se aprecia una especie de calma relativa al comportamiento durante el día, entre las 2:00 y las 5:00 horas se observa un pequeño componente desde el estenoreste (ENE) que probablemente se deba a los vientos terrales.




Figura 3.1.6. Rosa de viento horaria de la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023

En la Tabla 3.3 se presentan los parámetros meteorológicos registrados en la estación de monitoreo CA-ILO-03, durante el mes de enero de 2023. Se observa que la presión atmosférica varió entre una mínima de 982,8 hPa y una máxima de 992,7 hPa, no se registraron precipitaciones en el mes. La temperatura promedio fue 22,4°C, alcanzando una mínima de 18,6 °C y una máxima de 26,9 °C, la humedad relativa varió entre 53,2 y 89,1 % y la velocidad del viento osciló entre 0,2 y 8,1 m/s. El parámetro de radiación solar reporta un máximo de 1095,2 W/m² durante el mes de enero. Los valores se presentan en la Tabla 3.3, y el detalle del registro en el Anexo 3.

Tabla 3.3. Parámetros meteorológicos registrados en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

Valores	Presión atmosférica (hPa)	Precipitación (mm)	Temperatura (°C)	Humedad relativa (%)	Velocidad del viento (m/s)	Radiación solar (W/m ²)
Mínimo	982,8	0,0	18,6	53,2	0,2	0,0
Máximo	992,7	0,0	26,9	89,1	8,1	1095,2
Promedio	987,5	0,0	22,4	70,6	3,9	--

En la Figura 3.1.7 se grafica la rosa de viento de la estación de monitoreo CA-ILO-03, correspondiente al mes de enero de 2023. Se observa que la rosa de viento tuvo una predominancia sursureste (SSE). Es preciso mencionar que, en la referida dirección se encuentra el terminal terrestre de Ilo (tomándose como referencia la ubicación de la estación de monitoreo CA-ILO-03).




Figura 3.1.7. Rosa de viento de la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

En la Figura 3.1.8 se grafica la rosa de viento de la estación de monitoreo CA-ILO-03, por días de la semana, correspondiente al mes de enero de 2023. Donde se observa una predominancia sursureste (SSE) de lunes a domingo.




Figura 3.1.8. Rosa de viento por días de la semana de la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

En la Figura 3.1.9 se grafica la rosa de viento de la estación de monitoreo CA-ILO-03, por horas del día, correspondiente al mes enero de 2023. Donde se observa un incremento en la presencia de vientos bien marcada durante el día, iniciando el incremento a las 8:00 hasta las 17:00 horas aproximadamente, con vientos provenientes del sursureste (SSE). Durante la noche se aprecia una especie de calma relativa al comportamiento durante el día.




Figura 3.1.9. Rosa de viento horaria de la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

3.2 Material particulado con diámetro menor a 2,5 micras (PM_{2,5})

En las Figuras 3.2.1 y 3.2.2 se presentan las concentraciones de 24 horas de PM_{2,5} de las estaciones de monitoreo CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023. Además, se observa que todas las concentraciones de 24 horas no excedieron el ECA para aire de PM_{2,5} (50 µg/m³ en 24 horas).




Figura 3.2.1. Concentraciones de 24 horas de PM_{2,5} en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023




Figura 3.2.2 Concentraciones de 24 horas de PM_{2,5} en la estación de monitoreo CA-ILO-03, en enero de 2023

3.3 Material particulado con diámetro menor a 10 micras (PM₁₀)

En las Figuras 3.3.1 y 3.3.2 se presentan las concentraciones de 24 horas de PM₁₀ de las estaciones de monitoreo CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023. Además, se observa que todas las concentraciones de 24 horas no excedieron el ECA para aire de PM₁₀ (100 µg/m³ en 24 horas).




Figura 3.3.1. Concentraciones de 24 horas de PM₁₀ en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023




Figura 3.3.2. Concentraciones de 24 horas de PM₁₀ en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

3.4 Dióxido de azufre (SO₂)

En las Figuras 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3 se presentan las concentraciones de 24 horas de SO₂ de las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023. Además, se observa que todas las concentraciones de 24 horas no excedieron el ECA para SO₂ (250 µg/m³ en 24 horas).




Figura 3.4.1. Concentraciones de 24 horas de SO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-01, enero de 2023




Figura 3.4.2. Concentraciones de 24 horas de SO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023




Figura 3.4.3. Concentraciones de 24 horas de SO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023.

3.5 Sulfuro de hidrogeno (H₂S)

En las Figuras 3.5.1, 3.5.2 y 3.5.3 se presentan las concentraciones de 24 horas de H₂S de las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023. Además, se observa que todas las concentraciones de 24 horas no excedieron el ECA para aire de H₂S (150 µg/m³ en 24 horas).




Figura 3.5.1. Concentraciones de 24 horas de H₂S en la estación de monitoreo CA-ILO-01, enero de 2023




Figura 3.5.2. Concentraciones de 24 horas de H₂S en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023




Figura 3.5.3. Concentraciones de 24 horas de H₂S en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023.

3.6 Dióxido de nitrógeno (NO₂)

En las Figuras 3.6.1, 3.6.2 y 3.6.3 se presentan las concentraciones horarias de NO₂ de las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023. Además, se observa que todas las concentraciones horarias no excedieron el ECA para NO₂ (200 µg/m³ en 1 hora).




Figura 3.6.1. Concentraciones de horarias de NO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-01, enero de 2023.




Figura 3.6.2. Concentraciones de horarias de NO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023.




Figura 3.6.3. Concentraciones de horarias de NO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023.

3.7 Monóxido de carbono (CO)

En las Figuras 3.7.1, 3.7.2 y 3.7.3 se presenta el diagrama de cajas por hora de las concentraciones horarias de CO correspondiente a las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023. Además, se observa que todas las concentraciones horarias no excedieron el ECA para CO (30000 µg/m³ en 1 hora).




Figura 3.7.1. Concentraciones horarias de CO en la estación de monitoreo CA-ILO-01, enero de 2023




Figura 3.7.2. Concentraciones horarias de CO en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023




Figura 3.7.3. Concentraciones horarias de CO en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

En las Figuras 3.7.4, 3.7.5 y 3.7.6 se presenta el diagrama de cajas por hora de las concentraciones móviles de 8 horas de CO, correspondiente a las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023. Además, se observa que todas las concentraciones de promedio móvil de 8 horas no excedieron el ECA para CO (10000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en 8 horas móviles).




Figura 3.7.4. Concentraciones de promedio móvil de 8 horas de CO en la estación de monitoreo CA-ILO-01, enero de 2023




Figura 3.7.5. Concentraciones de promedio móvil de 8 horas de CO en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023




Figura 3.7.6. Concentraciones de promedio móvil de 8 horas de CO en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

3.8 Rosas de concentraciones

3.8.1 Material particulado con diámetro menor a 2,5 micras ($PM_{2,5}$)

En las Figuras 3.8.1 y 3.8.2 se presentan las rosas de concentraciones de $PM_{2,5}$ de las estaciones de monitoreo CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023.

En la estación de monitoreo CA-ILO-02, se observa que las mayores concentraciones coinciden con los vientos provenientes del noroeste (NW), norte (N), oeste (W), noreste (NE) y sursuroeste (SSW), donde hay baja presencia de vientos, por lo que, es probable que las concentraciones provengan de fuentes locales.




Figura 3.8.1. Rosa de concentración del PM_{2.5} en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero del 2023

Y en la estación CA-ILO-03, se observa que las mayores concentraciones de PM_{2.5} coinciden con los vientos que provienen del sursureste (SSE), con una frecuencia de vientos muy baja sobre las concentraciones entre 20 y 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, esta frecuencia de vientos es un aproximado de 0.5% de los vientos del SSE.




Figura 3.8.2. Rosa de concentración del $PM_{2.5}$ en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

En las Figuras 3.8.3 y 3.8.4 se presentan las rosas de concentraciones horarias de $PM_{2.5}$ de las estaciones de monitoreo CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023.

En la estación de monitoreo CA-ILO-02, se observa que las mayores concentraciones coinciden, en gran medida, con los vientos en horario nocturno. Desde las 21:00 hasta las 7:00 horas aproximadamente, cabe mencionar que los vientos en ese horario son normalmente noroeste (NW) y nornoroeste (NNW) y son de muy poca predominancia. Por lo que, probablemente se deban a fuentes locales.




Figura 3.8.3. Rosa de concentración horaria del PM_{2.5} en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023

Y en la estación de monitoreo CA-ILO-03, se observa que en el horario donde hay mayor predominancia de vientos desde el sursureste (SSE), entre las 10:00 y 17:00 horas, las concentraciones se encuentran en un rango de 0 a 20 µg/m³.




Figura 3.8.4. Rosa de concentración horaria del PM_{2.5} en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

3.8.2 Material particulado con diámetro menor a 10 micras (PM₁₀)

En las Figuras 3.8.5 y 3.8.6 se presentan las rosas de concentraciones de PM₁₀ de las estaciones de monitoreo CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023.

En la estación de monitoreo CA-ILO-02, se observa que las mayores concentraciones coinciden con los vientos provenientes del noroeste (NW), norte (N), oestenoeste (WNW), oeste (W), nornoroeste (NNW) y sursuroeste (SSW), donde hay baja presencia de vientos, por lo que, es probable que las concentraciones provengan de fuentes locales..




Figura 3.8.5. Rosa de concentración del PM₁₀ en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023

Y en la estación CA-ILO-03, se observa que las mayores concentraciones de PM₁₀ coinciden con los vientos que provienen del sursureste (SSE) y sureste (SE), donde cabe mencionar, hay mayor predominancia.




Figura 3.8.6. Rosa de concentración del PM₁₀ en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

En las Figuras 3.8.7 y 3.8.8 se presentan las rosas de concentraciones horarias de PM₁₀ de las estaciones de monitoreo CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes enero de 2023.

En la estación CA-ILO-02, se observa que las mayores concentraciones coinciden, en gran medida, con los vientos en horario nocturno. Desde las 22:00 hasta las 7:00 horas aproximadamente, cabe mencionar que los vientos en ese horario son normalmente noroeste (NW) y nornoroeste (NNW) y son de muy poca predominancia. Por lo que, probablemente se deban a fuentes locales.




Figura 3.8.7. Rosa de concentración horaria del PM₁₀ en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023

Y en la estación CA-ILO-03, se observa que en el horario donde hay mayor predominancia de vientos desde el sursureste (SSE), entre las 8:00 y 20:00 horas, las concentraciones se encuentran en un rango de 0 a 20 µg/m³.




Figura 3.8.8. Rosa de concentración horaria del PM₁₀ en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

3.8.3 Dióxido de azufre (SO₂)

En las Figuras 3.8.9, 3.8.10 y 3.8.11 se presentan las rosas de concentraciones de SO₂ de las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023.

En la estación de monitoreo CA-ILO-01, se observa que las mayores concentraciones coinciden con los vientos de mayor predominancia que provienen del sur (S) y sursureste (SSE) aunque con baja frecuencia, alrededor del 0.6% de los vientos del sur coinciden con un rango del 25 al 183.79 µg/m³. Y sobre el mismo rango de concentración mencionado hay una mayor frecuencia en los vientos de menor predominancia.




Figura 3.8.9. Rosa de concentración del SO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-01, enero de 2023

En la estación CA-ILO-02, se observa que, aunque con muy baja frecuencia, los vientos con mayor predominancia del sur (S) y sursureste (SSE) coinciden en algún momento con las concentraciones altas de SO₂, una mayor frecuencia en la presencia de vientos con las concentraciones del rango de 50 a 150 µg/m³ se observa en los vientos de menor predominancia, sobre todo los que provienen del noroeste y nor noroeste.




Figura 3.8.10. Rosa de concentración del SO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023

Y en la estación de monitoreo CA-ILO-03, se observa que de los vientos de mayor predominancia, las mayores concentraciones del rango de 20 y 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ se presentan en los vientos del sursureste (SSE). Cabe mencionar que hay coincidencia de altas concentraciones en los vientos de menor predominancia.




Figura 3.8.11. Rosa de concentración del SO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

En las Figuras 3.8.12, 3.8.13 y 3.8.14 se presentan las rosas de concentraciones horarias de SO₂ de las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023.

En la estación de monitoreo CA-ILO-01, se observa que hay una mayor presencia de altas concentraciones durante el horario nocturno mayormente, desde las 23:00 hasta las 8:00 horas. Cabe mencionar que durante la noche hay una menor presencia de vientos respecto al horario diurno.




Figura 3.8.12. Rosa de concentración horaria del SO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-01, enero de 2023

En la estación de monitoreo CA-ILO-02, se observa que hay una mayor presencia de altas concentraciones durante el horario nocturno mayormente, desde las 23:00 hasta las 9:00 horas. Cabe mencionar que durante la noche hay una menor presencia de vientos respecto al horario diurno.




Figura 3.8.13. Rosa de concentración horaria del SO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023

Y en la estación de monitoreo CA-ILO-03, se observa que desde las 9:00 hasta las 19:00 horas en los vientos de mayor predominancia, del sursureste (SSE), hay una coincidencia con un rango de concentraciones de 0 a 10 µg/m³. Sin embargo se observa una mayor presencia de concentraciones más altas durante la noche, cabe mencionar que los vientos son de baja intensidad en ese horario.




Figura 3.8.14. Rosa de concentración horaria del SO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

3.8.4 Sulfuro de hidrogeno (H₂S)

En las Figuras 3.8.15, 3.8.16 y 3.8.17 se presentan las rosas de concentraciones de H₂S de las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023.

En la estación de monitoreo CA-ILO-01, se observa que las mayores concentraciones coinciden con los vientos provenientes del noroeste (NW), nornoroeste (NNW), norte (N) y del ostenoroeste (WNW), donde hay baja presencia de vientos.




Figura 3.8.15. Rosa de concentración del H₂S en la estación de monitoreo CA-ILO-01, enero de 2023

En la estación de monitoreo CA-ILO-02, se observa que las mayores concentraciones de H₂S provienen del oeste (W), oestenoeste (WNW), noroeste (NW) y nornoroeste (NNW), donde hay poca presencia de vientos.




Figura 3.8.16. Rosa de concentración del H₂S en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023

Y en la estación de monitoreo CA-ILO-03, se observa que las concentraciones de H₂S en el rango de 5 a 10 µg/m³ coinciden con los vientos de mayor predominancia que provienen del sursureste (SSE).




Figura 3.8.17. Rosa de concentración del H₂S en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

En las Figuras 3.8.18, 3.8.19 y 3.8.20 se presentan las rosas de concentraciones horarias de H₂S de las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023.

En la estación CA-ILO-01, se observa que las mayores concentraciones de H₂S se presentan durante la noche a velocidades de viento muy bajas. Mientras que durante el día las direcciones predominantes sur (S) y sursureste (SSE) coinciden con rangos bajos de 5 a 10 µg/m³.




Figura 3.8.18. Rosa de concentración horaria del H₂S en la estación de monitoreo CA-ILO-01, enero de 2023

En la estación de monitoreo CA-ILO-02, se observa que las mayores concentraciones de H₂S se presentan durante la noche a velocidades de viento muy bajas y normalmente desde las direcciones noroeste (NW) y nornoroeste (NNW). Mientras que durante el día las direcciones predominantes sur (S) y sursureste (SSE) coinciden con rangos bajos de 5 a 15 µg/m³.




Figura 3.8.19. Rosa de concentración horaria del H₂S en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023

Y en la estación de monitoreo CA-ILO-03, se observa que las concentraciones de H₂S en el rango de 5 a 10 µg/m³ están presentes en todas las horas del día, en los vientos que provienen del sursureste (SSE) y sureste (SE).




Figura 3.8.20. Rosa de concentración horaria del H₂S en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

3.8.5 Dióxido de nitrógeno (NO₂)

En las Figuras 3.8.21, 3.8.22 y 3.8.23 se presentan las rosas de concentraciones de NO₂ de las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023.

En la estación CA-ILO-01, se observa que las mayores concentraciones provienen del noroeste (NNW) y norte (N), donde hay muy poca presencia de vientos.




Figura 3.8.21. Rosa de concentración del NO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-01, enero de 2023

En la estación de monitoreo CA-ILO-02, se observa que las mayores concentraciones de NO₂ provienen del noroeste (NW) y nornoroeste (NNW) donde hay baja presencia de vientos.




Figura 3.8.22. Rosa de concentración del NO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023

Y en la estación de monitoreo CA-ILO-03, se observa que en las direcciones predominantes de vientos, desde el sursureste (SSE) y sureste (SE) las concentraciones presentes están en un rango desde 0 hasta 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.




Figura 3.8.23. Rosa de concentración del NO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

En las Figuras 3.8.24, 3.8.25 y 3.8.26 se presentan las rosas de concentraciones horarias de NO₂ de las estaciones de monitoreo CA-ILO-01 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023.

En la estación de monitoreo CA-ILO-01, se observa que las mayores concentraciones se producen durante la noche donde los vientos cuentan con poca presencia.




Figura 3.8.24. Rosa de concentración horaria del NO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-01, enero de 2023

En la estación de monitoreo CA-ILO-01, se observa que las mayores concentraciones se producen durante la noche donde los vientos cuentan con poca presencia.




Figura 3.8.25. Rosa de concentración horaria del NO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023

Y en la estación de monitoreo CA-ILO-03, se observa que, durante el día, entre las 10:00 y 17:00 horas se muestra un rango bajo de concentraciones de 0 a 5 µg/m³, coincidente con los vientos predominantes del sursureste (SSE).




Figura 3.8.26. Rosa de concentración horaria del NO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

3.8.6 Monóxido de carbono (CO)

En las Figuras 3.8.27, 3.8.28 y 3.8.29 se presentan las rosas de concentraciones de CO de las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023.

En la estación de monitoreo CA-ILO-01, se observan rangos de 200 hasta 350 µg/m³ en las direcciones de viento predominantes del sur (S) y sursureste (SSE).




Figura 3.8.27. Rosa de concentración del CO en la estación de monitoreo CA-ILO-01, enero de 2023

En la estación de monitoreo CA-ILO-02, se observa que en las direcciones de viento predominante sur (S) y sursureste (SSE) las concentraciones se encuentran en un rango de 200 a 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.




Figura 3.8.28. Rosa de concentración del CO en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023

Y en la estación de monitoreo CA-ILO-03, se observan concentraciones en un rango de 200 a 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en la dirección predominante del sursureste (SSE). Y en la dirección sureste (SE) se observan concentraciones en un rango de 250 hasta 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.




Figura 3.8.29. Rosa de concentración del CO en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

En las Figuras 3.8.30, 3.8.31 y 3.8.32 se presentan las rosas de concentraciones horarias de CO de las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023.

En la estación de monitoreo CA-ILO-01, se observan concentraciones en un rango entre 300 y 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ entre las 18:00 y 21:00 horas en la dirección predominante del sursureste (SSE), probablemente producto del tráfico vehicular.




Figura 3.8.30. Rosa de concentración horaria del CO en la estación de monitoreo CA-ILO-01, enero de 2023

En la estación de monitoreo CA-ILO-02, se observan concentraciones en un rango entre 250 y 300 µg/m³ entre las 17:00 y 21:00 horas en la dirección predominante del sursureste (SSE), probablemente producto del tráfico vehicular.




Figura 3.8.31. Rosa de concentración horaria del CO en la estación de monitoreo CA-ILO-02, enero de 2023

Y en la estación de monitoreo CA-ILO-03, se observan mayores concentraciones de CO durante la noche, desde las 18:00 a las 8:00 horas aproximadamente en la dirección sursureste (SSE), con muy poca presencia de vientos.




Figura 3.8.32. Rosa de concentración horaria del CO en la estación de monitoreo CA-ILO-03, enero de 2023

3.9 Comportamiento temporal

3.9.1 Material particulado con diámetro menor a 2,5 micras (PM_{2,5})

En la Figura 3.9.1 y 3.9.2 se grafican las medias de las concentraciones horarias y por día en relación con las concentraciones de PM_{2,5}, para las estaciones de monitoreo CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero.

En la estación de monitoreo CA-ILO-02, la representación gráfica por días de monitoreo (c) muestra que en los jueves se registraron las mayores concentraciones de PM_{2,5}, según la validación de los datos se comprueba que el 'jueves' 12 de enero se registraron picos de valores alrededor de las 6:00 horas. En el caso de las medias horarias (b), se observa que las concentraciones de PM_{2,5} tienen valores elevados alrededor de las 6:00 horas y de las 23:00 horas.




Figura 3.9.1. Concentraciones promedio horarias de $PM_{2.5}$ en la estación de monitoreo CA-ILO-02, de enero de 2023

En la estación de monitoreo CA-ILO-03, la representación gráfica por días de monitoreo (c) muestra que en los días jueves se registraron las mayores concentraciones de $PM_{2.5}$, según la validación de los datos se comprueba que en los días 'jueves' 5 y 12 de enero se registraron picos de concentraciones. En el caso de las medias horarias (b) se aprecia que las concentraciones de $PM_{2.5}$ tiene valores elevados a las 6:00 y 22:00 horas.




Figura 3.9.2. Concentraciones promedio horarios de $PM_{2.5}$ en la estación de monitoreo CA-ILO-03, de enero de 2023

3.9.2 Material particulado con diámetro menor a 10 micras (PM₁₀)

En la Figura 3.9.3 y 3.9.4 se grafican las medias de las concentraciones horarias y por día en relación con las concentraciones de PM₁₀, para las estaciones de monitoreo CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero.

En la estación CA-ILO-02, la representación gráfica por días de monitoreo (c) muestra que en los jueves se registraron las mayores concentraciones de PM₁₀, según la validación de los datos se comprueba que en el día 'jueves' 12 de enero se registró un pico importante alrededor de las 6:00 horas, cabe mencionar que la velocidad de viento registro un valor de 0.2 m/s en ese momento, lo cual evidencia una muy baja dispersión del parámetro. En el caso de las medias horarias (b), se observa que las concentraciones de PM₁₀ tienen valores elevados en horas cercanas a las 6:00 horas y a las 23:00 horas.




Figura 3.9.3. Concentraciones promedio horarios de PM₁₀ en la estación de monitoreo CA-ILO-02, de enero de 2023

En la estación CA-ILO-03, la representación por días de monitoreo (c) muestra que en los días jueves se registraron las mayores concentraciones de PM₁₀, según la validación de los datos se comprueba que en los días 'jueves' 05 y 12 de enero el parámetro mostró picos de concentración. En el caso de las medias horarias (b), se observa que las concentraciones de PM₁₀ tienen valores elevados las 6:00 horas.




Figura 3.9.4. Concentraciones promedio horarios de PM₁₀ en la estación de monitoreo CA-ILO-03, de enero de 2023

3.9.3 Dióxido de azufre (SO₂)

En la Figura 3.9.5, 3.9.6 y 3.9.7 se grafican las medias de las concentraciones horarias y por día en relación con las concentraciones de SO₂ para las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero.

En la estación de monitoreo CA-ILO-01, la representación gráfica por días de monitoreo (c) muestra que en los días viernes se registraron las mayores concentraciones de SO₂, según la validación de los datos se comprueba que el día 'viernes' 20 de enero se registraron picos de valores alrededor de las 7:00 horas, cabe mencionar que el mismo día entre las 6:00 y 7:00 horas se registraron valores de velocidad de viento entre 0.8 y 1.5 m/s respectivamente, que probablemente haya contribuido a la baja dispersión del parámetro en estudio. En el caso de las medias horarias (b), se observa que las concentraciones tienen valores elevados en horas cercanas a las 00:00 y luego a las 7:00 horas aproximadamente.




Figura 3.9.5. Concentraciones promedio horarios de SO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-01, de enero de 2023

En la estación de monitoreo CA-ILO-02, la representación gráfica por días de monitoreo (c) muestra que en los viernes se registraron las mayores concentraciones de SO₂, según la validación de los datos se comprueba que en los días 'viernes' 06 y 13 de enero se registraron picos de concentraciones. En el caso de las medias horarias (b), se observa que las concentraciones de SO₂ tienen valores elevados en horas cercanas a las 2:00, 5:00 y 23:00 horas, sin embargo, cabe mencionar que en general los valores altos del parámetro son presentados en horario nocturno y también puede confirmarse lo mencionado al observar la gráfica por días de la semana (a).




Figura 3.9.6. Concentraciones promedio horarios de SO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-02, de enero de 2023

En la estación CA-ILO-03, la representación gráfica por días de monitoreo muestra que en los lunes, martes y jueves se registraron las mayores concentraciones de SO₂, según la validación de los datos se comprueba que en los días 'lunes' 9, 'lunes' 16, 'jueves' 26 y 'martes' 31 de enero se registraron picos de valores. En el caso de las medias horarias (b), se observa que las concentraciones de SO₂ tienen valores elevados en horas cercanas a las 3:00, luego a las 6:00 horas, sin embargo, cabe mencionar que durante el horario nocturno se registraron valores más altos respecto al horario diurno, lo cual puede confirmarse al observar el gráfico horario por días de la semana (a).




Figura 3.9.7. Concentraciones promedio horarias de SO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-03, de enero de 2023

3.9.4 Sulfuro de hidrogeno (H₂S)

En la Figura 3.9.8, 3.9.9 y 3.9.10 se grafican las medias de las concentraciones horarias y por día en relación con las concentraciones de H₂S, para las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero.

En la estación de monitoreo CA-ILO-01, la representación gráfica por días de monitoreo (c) muestra que en los miércoles, jueves y domingo se registraron las mayores concentraciones de H₂S, según la validación de los datos se comprueba que en los días 'miércoles' 04, 'jueves' 19, miércoles 25 y domingo 22 de enero se registraron picos importantes de valores. En el caso de las medias horarias (b), se observa que las concentraciones de H₂S tienen valores elevados en horas cercanas a la 1:00, luego a las 6:00 y las 23:00 horas, sin embargo, cabe mencionar que durante el horario nocturno se registraron valores más altos respecto al horario diurno, lo cual puede confirmarse al observar el gráfico horario por días de la semana (a).




Figura 3.9.8. Concentraciones promedio horarios de H₂S en la estación de monitoreo CA-ILO-01, de enero de 2023

En la estación de monitoreo CA-ILO-02, la representación gráfica por días de monitoreo (c) muestra que en los jueves se registraron las mayores concentraciones de H₂S, según la validación de los datos se comprueba que en los días 'jueves' 12 y 19 de enero se registraron picos importantes de concentraciones. En el caso de las medias horarias (b), se observa que las concentraciones de H₂S tienen valores elevados en horas cercanas a las 6:00, luego entre las 23:00 y las 00:00 horas, sin embargo, cabe mencionar que durante el horario nocturno se registraron valores más altos respecto al horario diurno, lo cual puede confirmarse al observar el gráfico horario por días de la semana (a).




Figura 3.9.9. Concentraciones promedio horarios de H₂S en la estación de monitoreo CA-ILO-02, de enero de 2023

En la estación de monitoreo CA-ILO-03, la representación gráfica por días de monitoreo (c) muestra que en los martes se registraron las mayores concentraciones de H₂S, según la validación de los datos se comprueba que en los días 'martes' 10 y 31 de enero se registraron picos importantes de concentraciones. En el caso de las medias horarias (b), se observa que las concentraciones de H₂S tienen valores elevados alrededor de las 7:00 y las 00:00 horas.




Figura 3.9.10. Concentraciones promedio horarias de H₂S en la estación de monitoreo CA-ILO-03, de enero de 2023

3.9.5 Dióxido de nitrógeno (NO₂)

En la Figura 3.9.11, 3.9.12 y 3.9.13 se grafican las medias de las concentraciones horarias y por día en relación con las concentraciones de NO₂, para las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero.

En la estación de monitoreo CA-ILO-01, la representación gráfica por días de monitoreo (c) muestra que en los miércoles y sábado se registraron las mayores concentraciones de NO₂, según la validación de los datos se comprueba que en el día 'sábado' 14 de enero se registró un pico importante. En el caso de las medias horarias (b), se observa que las concentraciones de NO₂ tienen valores elevados alrededor de la 1:00 y las 6:00 horas. Y observando la gráfica de medias horarias por días de la semana (a) hay un pico mostrado normalmente alrededor de las 6:00 horas de lunes a domingo, que probablemente pueda deberse al tráfico vehicular.




Figura 3.9.11. Concentraciones promedio horarias de NO_2 en la estación de monitoreo CA-ILO-01, de enero de 2023

En la estación de monitoreo CA-ILO-02, la representación gráfica por días de monitoreo (c) muestra que en los martes y sábado se registraron las mayores concentraciones de NO_2 , según la validación de los datos se comprueba que en el día 'sábado' 14, 'martes' 17, 24 y 31 de enero se registraron picos de concentraciones. En el caso de las medias horarias (b), se observa que las concentraciones de NO_2 tienen valores elevados alrededor de las 6:00 horas y entre las 23:00 y 01:00 horas. Y observando la gráfica de medias horarias por días de la semana (a) hay un pico mostrado normalmente alrededor de las 6:00 horas de lunes a domingo, que probablemente pueda deberse al tráfico vehicular.




Figura 3.9.12. Concentraciones promedio horarias de NO_2 en la estación de monitoreo CA-ILO-02, de enero de 2023

En la estación de monitoreo CA-ILO-03, la representación gráfica por días de monitoreo (c) muestra que en los días miércoles y sábado se registraron las mayores concentraciones de NO₂, según la validación de los datos se comprueba que en los días 'miércoles' 4 y 'sábado' 14 y 21 de enero se registraron picos de valores. En el caso de las medias horarias (b), se observa que las concentraciones de NO₂ tienen valores elevados en horas cercanas a las 6:00 horas. Y observando la gráfica de medias horarias por días de la semana (a) hay un pico mostrado normalmente alrededor de las 6:00 horas de lunes a domingo, que probablemente pueda deberse al tráfico vehicular.




Figura 3.9.13. Concentraciones promedio horarias de NO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-03, de enero de 2023

3.9.6 Monóxido de carbono (CO)

En la Figura 3.9.14, 3.9.15 y 3.9.16 se grafican las medias de las concentraciones horarias y por día en relación con las concentraciones de CO, para las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero.

En la estación de monitoreo CA-ILO-01, la representación gráfica por días de monitoreo (c) muestra que en los miércoles y domingo se registraron las mayores concentraciones de CO, según la validación de los datos se observa que el pico más destacado es del domingo 01 de enero entre la 00:00 y 01:00 horas, durante las celebraciones de año nuevo. En el caso de las medias horarias (b), se observa que las concentraciones de CO tienen valores elevados alrededor de las 6:00 y posteriormente alrededor de las 19:00 horas. También se confirma en la gráfica de medias horarias por día de la semana (a) los picos mencionados de las 6:00 y 19:00 horas de lunes a domingo, que probablemente deba su origen al tráfico vehicular.




Figura 3.9.14. Concentraciones promedio horarios de CO en la estación de monitoreo CA-ILO-01, de enero de 2023

En la estación de monitoreo CA-ILO-02, la representación gráfica por días de monitoreo (c) muestra que en los días sábado, domingo y lunes se registraron las mayores concentraciones de CO, según la validación de los datos se observa que el día 'sábado' 28 de enero se registró un pico importante. En el caso de las medias horarias (b), se observa que las concentraciones de CO tienen valores elevados en horas cercanas a las 6:00 horas y a las 19:00 horas. También se confirma en la gráfica de medias horarias por día de la semana (a) los picos mencionados de las 6:00 y 19:00 horas de lunes a domingo, que probablemente deba su origen al tráfico vehicular.




Figura 3.9.15. Concentraciones promedio horarios de CO en la estación de monitoreo CA-ILO-02, de enero de 2023

En la estación de monitoreo CA-ILO-03, la representación gráfica por días de monitoreo (c) muestra que en los días lunes, martes, miércoles y domingo se registraron las mayores concentraciones de CO, y según la validación de los datos se observa que, aunque haya picos de valores como el del martes 10 de enero, no es un máximo destacable. En el caso de las medias horarias (b), se observa que las concentraciones de CO tienen valores elevados alrededor de las 6:00, 19:00 y 22:00 horas. También se confirma en la gráfica de medias horarias por día de la semana (a) los picos mencionados de las 6:00 y 19:00 horas de lunes a domingo, que probablemente deba su origen al tráfico vehicular.




Figura 3.9.16. Concentraciones promedio horarios de CO en la estación de monitoreo CA-ILO-03, de enero de 2023

3.10 Estados de alerta

En las Figuras 3.10.1, 3.10.2 y 3.10.3 se presentan las concentraciones móviles de 3 horas de SO_2 , correspondiente a las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, del mes de enero de 2023. Además, se observa que todas las concentraciones de promedio móvil de 3 horas no excedieron el estado de cuidado para SO_2 ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$) según el Decreto Supremo N.°009-2003-SA.




Figura 3.10.1. Concentraciones de promedio móvil de 3 horas de SO_2 en la estación de monitoreo CA-ILO-01, en enero de 2023




Figura 3.10.2. Concentraciones de promedio móvil de 3 horas de SO_2 en la estación de monitoreo CA-ILO-02, en enero de 2023




Figura 3.10.3. Concentraciones de promedio móvil de 3 horas de SO₂ en la estación de monitoreo CA-ILO-03, en enero de 2023

4 CONCLUSIONES

- En las estaciones de monitoreo CA-ILO-02 y CA-ILO-03, ubicadas en la provincia de Ilo, las concentraciones de 24 horas de material particulado con diámetro menor a 10 micras (PM₁₀) no excedieron su respectivo ECA, durante el mes de enero de 2023.
- En las estaciones de monitoreo CA-ILO-02 y CA-ILO-03, ubicadas en la provincia de Ilo, las concentraciones de 24 horas de material particulado con diámetro menor a 2,5 micras (PM_{2,5}) no excedieron su respectivo ECA, durante el mes de enero de 2023.
- En las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, las concentraciones de dióxido de azufre (SO₂) no excedieron su respectivo ECA, durante el mes de enero de 2023.
- En las estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, las concentraciones de sulfuro de hidrógeno (H₂S) no excedieron su respectivo ECA, durante el mes de enero de 2023.
- En las tres estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, las concentraciones horarias de monóxido de carbono (CO) no excedieron su respectivo ECA, así como lo promedios móviles de 8 horas de CO, durante el periodo evaluado de enero de 2023.

- En las tres estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, las concentraciones horarias de dióxido de nitrógeno (NO_2) no excedieron su respectivo ECA, durante el periodo evaluado de enero de 2023.
- No se presentaron estados de alerta sobre los niveles de cuidado de SO_2 ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 3 horas promedio móvil), durante la evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en las tres estaciones de monitoreo CA-ILO-01, CA-ILO-02 y CA-ILO-03, ubicadas en la provincia de Ilo (enero de 2023).

5 ANEXOS

Anexo 1: Mapa de ubicación.

Anexo 2: Datos crudos.

Anexo 3: Sistematización de datos válidos.

Anexo 4: Certificados de Calibración y fichas de verificación.

Atentamente:

Jorge Luis Hualpa Amable

DNI: 10734302